

*fronte convexo, haud gibboso, sed medio sulcato; scutello utrinque gibboso, medio plano; femoribus posticis incrassatis, postice denticulatis, trochanteribus evidenter constructis, postice dente curvato armatis; tibiis triquetris, intus ante apicem profunde emarginatis.* — Long 27 mm. — lat. 8 mm.

1 ♀ von Para (Schulz).

N.-Brasil.

### Diagnosen verschiedener *Phytaecia* aus dem Orient

von T. Pic (Digoin).

*Phytaecia croceipes* Reiche v. *annulifer*. *Niger, elongatus angustatusque; pedibus anticis tarsis exceptis flavis, femoribus intermediis ante apicem annulatis.* L. 6 mm.

Palästina: Jericho (coll. Pic).

Kennzeichnet sich mit Leichtigkeit durch seine schmale gestreckte Gestalt und die Färbung seiner Glieder; nahe verwandt mit *manicata* Muls., aber die Mittelschenkel sind nicht ganz dunkel, sondern gegen die Spitze rothgelb geringelt.

*Phytaecia ingeniculata*. *Niger, elongatus, subparallelus, pedibus anticis tarsis exceptis flavis, femoribus intermediis ante apicem indistincte flavis; thorace subcylindrico, fulvo lineato; scutello fulvo-pubescente; elytris pube tenui cinerea vestitis; episternis metathoracis dense fulvo-tomentosis; pygidio nigro.* L. 10 mm.

Syria: St. Jean d'Acre (coll. Pic, olim Tournier).

Nächst verwandt mit *geniculata* Muls., aber paralleler und sehr verschieden durch die dunkle Färbung der Hinterchenkel und die Mittelschenkel an der Spitze undeutlich rotgelb gefleckt.

*Phytaecia (Helladia) humeralis* v. *bethaniensis*. *Niger, subelongatus, pedibus anticis pro parte flavis; elytris pube tenui grisescente vestitis; pygidio nigro.* L. 8--9 mm.

Palästina: Bethania (Pic).

Unterscheidet sich von *humeralis* Waltl durch das schwarze Pygidium, die dichtere und grauere Behaarung der Flügeldecken, die kleine rothgelbe Humeralmakel.

*Phytaecia (Helladia) dilaticollis*. ♂. *Niger, robustus, postice attenuatus; thorace macula media rufo-testacea; angulo elytrorum epipleurali, abdomine, antennis pedibusque pro*

*parte testaceis; thorace latiore, lateribus valde rotundato dilatato et dense luteo-fulvescente tomentoso; scutello luteo-tomentoso; elytris pube tenui cinerea dense vestitis. L. 13 mm.*

Asia minor (coll. Pic).

Nahe verwandt mit *H. Adelpha* Ganglb., aber von dieser deutlich verschieden durch die, auf den Seiten des Halsschildes sehr verbreitete, rothgelbe Behaarung; kennzeichnet sich weiter noch durch seine Gestalt, den kurzen und ganz queren Halsschild, die grosse gelbe Makel auf diesem Organe. Ich beziehe als ♀ auf diese Art ein sehr deflorirtes Stück, das ich von Herrn Staudinger und Bang-Haas erhielt und das von Mardin kommt. Dieses Thier, obschon es deflorirt ist, wird mit Leichtigkeit erkannt durch seine grosse Gestalt und die helle Makel des Halsschildes; es bietet eine fast ganz schwarze Abdominalfärbung.

Meldung! Da ich mir das Aufstellen von Bestimmungstabellen über die *Phytaecia* oder wenigstens über die Gruppe *Helladia* vorgenommen habe, wäre ich meinen Collegen sehr dankbar, wenn sie mir ihr Material in Mittheilung schicken wollten; mit dieser Hülfe hoffe ich eine bessere und vollständigere Studie machen zu können.

### Carabologische Notizen VI.

Von Dr. H. Roeschke-Berlin.

Von den Carabiden des Britischen Museums

(Schluss von No. V. Ent. Nachr. 1900 p. 57)

sind folgende interessant und erwähnenswerth:

*Carabus clathratus* L. kommt auf den schottischen Inseln, z. B. Mull, mit hell bräunlichroten Beinen vor, die Unterseite ist pechbraun. Wohl eine Folge des Salzgehaltes des Bodens; ich erinnere an *Cal. haligena* und *galopageium*.

*Car. cycchropalpus* Peyron. Lippentaster 2-borstig. Halsschild mit deutlichen Hinterecken, seitlich deutlich abgesetzt, mit einer einzigen Lateralseta. Abdomen mit Borstenpunkten, aber ohne Ventralfurchen.

*Car. dubius* Motsch. kleiner *regalis*.

*Car. gladiator* „Barnston“ = *taedatus* var. von der Hudsonbay. Dort kommen zwei verschiedene Formen vor:

1) eine kleinere von 16—22 mm, kürzer, gewölbter mit breiterem, seitlich gerundeterem, nach hinten stärker ver-